X線による超新星残骸の観測的研究

理化学研究所 玉川高エネルギー宇宙物理研究室
勝田 哲(基礎科学特別研究員)

超新星爆発

超新星 SN1987A

超新星爆発:

- 星が急激に10億倍ほど増光する天体現象。
- 星が死滅する際の大爆発(宇宙最大規模)。
- 重元素や宇宙線の供給源としても重要。

歴史に刻まれる超新星爆発

近場で起これば昼でも見えるほど明るくなる。

インディアンの壁画

歴史書に記された超新星爆発

- SN185
- SN393
- SN1006
- SN1054
- SN1181
- SN1572
- SN1604

藤原定家の明月記

超新星爆発の名残＝超新星残骸

X線天文衛星

チャンドラ

衛星	稼動期間	国	特徴
チャンドラ	1999-	米国	空間分解能(0.5 秒角)
ニュートン	1999-	欧州	有効面積
すざく	2005-	日本	低エネルギーでの感度

©CXC

ニュートン

©ESA

すざく

©ISAS/JAXA

何れも焦点面検出器に非分散系のX線
CCDを搭載。
⇒撮像と同時に分光が可能。

観測データと引き出せる情報

画像

©CXC

鮮明なX線画像
⇒運動の直接撮像
(時間を空けた複数の観測の比較から)

ス

X線の明るさ

本研究内容

X線天文衛星「チャンドラ」、「ニュートン」、「すざく」を駆使し、以下の成果を得た。

1. SNRの膨張を世界に先駆けて測定し、SNRの運動を明らかにした。
2. 爆発噴出物が非一様に飛散していることを発見した。
3. 電荷交換反応由来のX線を発見した。

1.1 ベラジュニアSNR

ROSAT all-sky survey

1.3-2.4 keV

- 1998年に「ローサット」衛星が見つけた新しいSNR(Aschenbach 1998)
- 発見と同時に ^{44}Ti γ 線放射も検出された(lyudin+1998)
 - ⇒若く(年齢~700 yr)、近い(距離~600光年)
- 中性子星の発見(Slane+2001; Kargaltsev+2002)
 - ⇒年齢~数千年、距離~3000光年

両者の見積もりに矛盾

1.1 「ニュートン」による膨張率測定

「ニュートン」が2001年から2007年にかけてベラジュニア北西端を複数回観測。

2001-2007 (差分画像)

6.5年で5秒角の移動⇒膨張率0.02%/yr
他のSNRの膨張率との比較により、ベラジュニアの年齢を**2000年程度**と推定。
距離も**2200光年以上**と算出した。

1.2 歴史的SNRの膨張率測定

Tycho (SN1572)
(ティコ・ブラーエ)

2003-2007

Katsuda+ 2010

2000-5000 km/s

Kepler (SN1604)
(ヨハネス・ケプラー)

2000-2006

Katsuda+ 2008

1500-5000 km/s

SN1006
(藤原定家)

2000-2009

Katsuda+ 2009

~5000 km/s

2. 巨大SNRの大規模観測

全天で輝度ベスト3のSNRに着目

ベラSNR (ROSAT)

Puppis A SNR
(ROSAT)

白鳥座ループSNR
(ROSAT)

2.1 ベラ周辺の破片構造の観測

○ ニュートンの視野
□ すざくの視野

重元素に富んでいることを見出し、真に星の破片であることを明らかにした。

2.2 白鳥座ループ内部の詳細解析

画像は「ローサット」による

□: Suzaku ○: XMM-Newton

Tsunemi+2007; Katsuda+2008; Katsuda PhD thesis 2008

全てのスペクトルを二成分モデルでフィット。

⇒爆発噴出物の分布を調査。

2.2 非一様な爆発噴出物

シリコン

鉄

シリコンと鉄は1:2(北:南)で非対称に分布

2.3 Puppis Aの詳細解析

星間物質が支配的

O, Ne, Mg, Si, Fe の塊

O, Ne, Mg の塊

特性X線のドップラーシフトを発見。
~2000km/s でこちらに向かって飛んでいることが判明。

Katsuda+ 2008

O, Ne, Mg の塊

Katsuda+ 2010

2.3 爆発噴出物と反跳する中性子星

Hwang+2008

爆発噴出物
全て北東部に位置する。

可視光観測
Winkler+ 1988

中性子星は高速で反跳

秒速1600km

爆発メカニズムの解明に期待。

3. 電荷交換反応X線を初検出

Katsuda+ 2011

白鳥座ループ外縁領域を「すぎく」と「ニュートン」で網羅的に観測

「電荷交換X線」

中性ガスと高階電離プラズマの接触面で必ず発生。地上実験や彗星(その大気と太陽風の接触面)などでは普通に観測されている。

彗星「百武」(Lisse+ 1996)

等高線がX線(電荷交換由来)、画像は可視光

一部のスペクトル

典型的なスペクトル

電荷交換反応「 $O^{7+} + H \rightarrow O^{6+} + p$ 」に由来するヘリウム様酸素からの特性X線と提唱した。

SNRから初検出

SNRの電荷交換X線から、無衝突衝撃波や粒子加速の物理を解き明かしていきたい。

まとめ

X線天文衛星「チャンドラ」、「ニュートン」、「すざく」を駆使し、以下の成果を得た。

1. SNRの膨張を世界に先駆けて測定し、SNRの運動を明らかにした。
2. 爆発噴出物が非一様に飛散していることを発見した。
3. 電荷交換反応由来のX線を発見した。

謝辞

ご指導頂いた先生方、
「すざく」、「チャンドラ」、「ニュートン」衛星の
開発・運用に携わる皆様、

ご支援頂いた大阪大学、日本学術振興会、
NASA/GSFC、理化学研究所の皆様、

- 宇宙科学奨励賞を授与下さった
宇宙科学振興会の皆様

に深くお礼申し上げます。